

核准日期: 2014.06.06  
修改日期: 2017.04.11  
修改日期: 2020.12.01

## 聚卡波非钙片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用


保畅®

【药品名称】

通用名称: 聚卡波非钙片  
英文名称: Calcium Polycarbophil Tablets  
汉语拼音: Jukabofeigai Pian

【成 分】聚卡波非钙。

化学名称: 3,4-二羟基-1,5-己二烯交联聚丙烯酸钙。  
化学结构式:



分子式:  $(C_6H_{10}CaO_4)_n \cdot (C_6H_{10}O_4)_m$

【性 状】本品为薄膜衣片，除去包衣后显白色或类白色。

【适 应 症】本品用于缓解肠易激综合征（便祕型）患者的便祕症状。

【規 格】0.5g

【用法用量】

口服。成人常用量为一次 2 片 (1.0g)，一日 3 次。饭后用足量水送服。一般疗程不超过 2 周。

【不良反应】

本品可能发生的常见 (1%~10%，含 1%) 和偶见 (0.1%~1%，含 0.1%) 不良反应主要有：消化系统不良反应 (如：恶心、口干、嗳气、呕吐、口渴、腹胀、腹泻、便秘、腹痛、肠鸣等)；过敏反应 (如：皮疹、瘙痒等)；血液系统不良反应 (如：血小板升高、白细胞减少)；肝、肾功能异常 [如：血清丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、血清门冬氨酸氨基转移酶升高、尿潜血、尿蛋白阳性]，此外还有水肿、头痛、头晕。

在日本完成的有 751 例受试者参加的上市前临床试验中，发生不良反应的有 54 例 (7.1%)，其中恶心、呕吐 13 例 (1.7%)，皮疹 10 例 (1.3%)，口渴 9 例 (1.2%)，水肿 6 例 (0.8%)，瘙痒 5 例 (0.67%)。此外，还发现患者实验室检查值发生异常变化，其中 ALT 上升 1.17% (5/427)，尿潜血检查阳性 0.78% (2/225)，蛋白尿检查阳性 0.62% (2/321)，白细胞减少 0.47% (2/423)。

【禁 忌】

本品禁用于下列患者：  
1. 急性腹部疾病 (阑尾炎、肠出血、溃疡性结肠炎) 的患者。  
2. 手术后有可能发生肠梗阻的患者。  
3. 高钙血症患者。  
4. 肾结石患者。  
5. 肾功能不全 (轻度肾功能不全和透析中的患者除外) 的患者。  
6. 对本品成分有过敏史的患者。

【注意事项】

1. 重要提醒：  
(1) 使用本品仅是对症治疗。本品服用后途中噎住时，有可能膨胀堵塞咽喉和食道，因此应与足量 (250ml 左右) 的水同服。  
(2) 使用本品如症状没有改善需停止服用 (通常以 2 周的时间为限)。  
(3) 本品长期用药的安全性和疗效尚未得到确认。  
2. 下列患者应该慎重使用本品：

- (1) 聚用活性维生素 D 的患者 (容易患高钙血症)。
- (2) 应用强心苷的患者 (有可能增加强心苷作用)。
- (3) 聚用抗高钙血症的患者 (有可能发生高钙血症)。
- (4) 被诊断骨质缺乏和有背部切除既往史的患者 (有可能难以充分发挥药效)。
- (5) 透析和轻度肾功能不全的患者 (有可能加重肾脏组织钙化)。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

因为孕妇使用本品的安全性尚未确认。对于孕妇或准备妊娠的妇女，只有在治疗上的益处远大于风险时才可服用本品。

【儿童用药】

儿童使用本品的安全性尚未确认，不推荐使用。

【老年用药】

一般情况下，老年人多数肾功能低下，容易形成高钙血症，使用本品应该减量或注意调整剂量。

【药物相互作用】

1. 活性维生素 D 制剂 (如阿尔法骨化醇、骨化醇) 会促进肠道钙吸收，与本品合用易发生高钙血症。
2. 利尿剂 (如 L- 天冬氨酸钙、乳酸钙等) 与本品合用会导致钙摄取过量，并导致本品脱钙状态下与钙离子发生再结合，减弱本品的药效。
3. 本品可能增强地高辛等强心苷的作用，导致心律不齐。
4. 本品可与四环素类抗生素 (四环素、米诺环素等)、喹诺酮类抗生素 (诺氟沙星、盐酸培氟沙星、甲苯磺酸妥舒沙星等) 形成螯合物，影响抗生素的吸收，降低疗效。
5. 质子泵抑制剂 (奥美拉唑、兰索拉唑等)、H2 受体拮抗剂 (法莫替丁、雷尼替丁等)、制酸剂 (氢氧化铝、氢氧化镁等) 可导致胃内 pH 值上升，抑制本品脱钙从而降低药效。

【药物过量】

如发生急性过量，应严密观察并给予对症和支持治疗。

【药理毒理】

本品在胃内酸性条件下，脱钙形成聚卡波非，在小肠或大肠的中性环境下显示了高度的吸水性，膨胀成为凝胶，保持消化道内水分，调节消化道内容物的输送，从而对便秘发挥治疗作用。

【药代动力学】

大鼠和犬口服  $^{14}C$ - 聚卡波非钙后血中放射性标记物浓度测定试验、尿 / 粪排泄试验、大鼠全身放射自显影试验、胆汁排泄试验和原位消化道吸收试验结果显示，聚卡波非钙在消化道不被吸收。

通过测定大鼠血中马来酸曲美布汀、安定、西咪替丁等药物的浓度，证实聚卡波非钙不影响这些药物的吸收。

【贮 藏】密封保存。

【包 装】

口服固体药用高密度聚乙烯瓶装。20 片 / 瓶、30 片 / 瓶、42 片 / 瓶、50 片 / 瓶和 60 片 / 瓶。

【有 效 期】36 个月。

【执行标准】YBH02112014

【批准文号】国药准字 H20140067

【生产企】

企业名称: 山东新华制药股份有限公司  
生产地址: 山东省淄博市张店区东一路 14 号  
邮政编码: 255005  
电话号码: 0533-2196361  
传真号码: 0533-2196365  
网址: www.xhzy.com

【药品上市许可持有人】

企业名称: 山东新华制药股份有限公司  
注册地址: 淄博市高新技术产业开发区化工区  
邮政编码: 255000  
电话号码: 0533-2166666  
传真号码: 0533-2184991  
网址: www.xhzy.com  
如有问题可与生产企业联系

签字及日期

马健华 2020.11.24

品名规格	聚卡波非钙片	改版项目	说明书	签字及日期	马健华 2020.11.24
包装材质		版本号	C		
成品尺寸	120mm × 160mm	印刷颜色	黑色 (印刷与提供色样有偏差， 以最后印刷稿为准。)		
修订日期		字体	7 号，书宋		